

Оперативный план мероприятий по профилактике  
энтеровирусной инфекции (ЭВИ)  
в СОШ № 27 на 2017-2018 учебный год.

Основная цель: предупреждение вспышек ЭВИ в организованных коллективах

Основная задача: эффективная работа по профилактике ЭВИ всех служб (здравоохранения и образования) в период сезонного подъёма и широкая пропаганда мер личной и общественной профилактики энтеровирусной инфекции.

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	<b>Разработать и утвердить руководителем ОО комплексный (оперативный) план санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, обеспечивающих предупреждение возникновения энтеровирусных инфекций в ОО (при наличии предпосылок и предвестников эпидемического неблагополучия), с назначением ответственных за каждый раздел работы:</b>	Сентябрь	Администрация СОШ № 27, мед. работник
	1. Обеспечить наличие в ОО нормативных документов и выполнение их требований: Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций» СП 3.1.2950-11. Методические указания «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций». МУ 3.1.1.2363-08. Методические указания МУ 3. 5. 3104 -13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях» Приказ ДЗиФ ЯО, ДО ЯО, УФСНСЗППиБЧ ЯО №№1637/67/48/ от 19.08.2014 г. «О мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации по энтеровирусным инфекциям и предупреждению их распространения в организованных коллективах детей». Оперативный план мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции (ЭВИ) в Ярославской области на сезон 2014 года.	Сентябрь и постоянно	Администрация СОШ № 27
	2. Провести семинары и педагогические советы с информацией по эпид. ситуации и по профилактике по ЭВИ.	Согласно плану по эпид.пока занятиям	Администрация СОШ № 27, мед. работник
	3. Провести расчёты необходимого количества дезинфицирующих средств, ёмкостей для проведения профилактической и текущей дезинфекции в соответствии с МУ 3. 5. 3104 -13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при	Сентябрь, постоянно	Администрация СОШ № 27, мед. работник

энтеровирусных (неполио) инфекциях»		
<p>4. Иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств</p> <p>К применению для дезинфекции допускать только средства, зарегистрированные в установленном порядке, имеющие свидетельство о государственной регистрации, декларацию о соответствии, инструкцию по применению, в которой должно содержаться указание на вирулицидное действие дезинфицирующего средства, этикетку (тарную).</p> <p>Для проведения дезинфекции использовать наиболее безопасные дезинфицирующие средства, а также хлорактивные средства, разрешенные для применения в детских учреждениях. Не применять средства на основе альдегидов, фенолов и надуксусной кислоты.</p>	Постоянно	Администрация СОШ № 27, педагогический коллектив, техн. персонал, мед. работник
<p>5. Приобрести индивидуальные ёмкости (флаконы) небольших объёмов моющих средств с антибактериальным действием для персонала пищеблоков ОО для использования в период сезонного подъёма заболеваемости и при возникновении очагов инфекции</p>	Сентябрь	Администрация СОШ № 27
<p>6. Заключить договор с организациями для проведения заключительной дезинфекции помещений, дезинсекции и обеззараживания <i>камерным методом</i>.</p>	Сентябрь	Администрация СОШ № 27, педагогический коллектив, техн. персонал, мед. работник
<p>7. Обеспечить систему информационно-разъяснительной работы среди населения (дети, родители персонал ОО) по вопросам профилактики ЭВИ с использованием памяток, бесед, родительских собраний и т.д.), контроль за соблюдением правил личной гигиены.</p>	Постоянно и при возникновении очагов	Администрация СОШ № 27, педагогический коллектив, мед. работник
<p>8. Исключить переуплотнённость детей в ОО</p>	Постоянно	Администрация СОШ № 27
<p>9. Осуществлять ежедневное слежение за причинами отсутствия учащихся, а также опрос детей о наличии жалоб (повышение температуры, боли в горле, головная боль), а также своевременную изоляцию из ОО.</p>	Постоянно	Педаг. коллектив (оказывать содействие мед. работник) мед. работник
<p>10. Не допускать детей из числа контактных с больными ЭВИ в ОО в течение 20 дней (из очага серозного менингита), в течение 10 дней ( из очага других форм ЭВИ).</p>	Постоянно	Администрация СОШ № 27, педагогический коллектив, мед. работник
<p>11. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима детских дошкольных, образовательных учреждений; усиление контроля за системой водоснабжения, организацией питания, питьевого режима, содержанием территории, соблюдением режима детских организованных коллективов, соблюдением режима влажной уборки и проветривания.</p> <p>Столы, клеенки обеденных столов, пластмассовые скатерти после каждого приема пищи мыть с использованием синтетических моющих средств, а при их отсутствии - горячим мыльным или 2% содовым раствором с помощью чистой прокипяченной ветоши.</p> <p>Проводить не реже 1 раза в неделю генеральную уборку помещений в ОО с</p>	Постоянно	Администрация СОШ № 27 техн. персонал, мед. работник

	использованием дезинфицирующих средств (вирулицидных препаратов).		
	<p>12. Организовать профилактическую дезинфекцию в местах общего пользования – туалетах, ванных комнатах, буфетах, столовых, пищеблоке и других помещениях с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием в отношении энтеровирусных (неполио) инфекций.</p> <p>В санузлах, душевых, ванных комнатах дезинфицировать ручки дверей, водопроводные краны, кнопки, клавиши и другие устройства смывных бачков, санитарно-техническое оборудование (раковины, унитазы, ванны, поддоны).</p>	Постоянно	Администрация СОШ № 27, техн. персонал, мед. работник
	<p>13. Обеспечить соблюдение обязательных требований санитарного Законодательства по содержанию, эксплуатации, условиям воспитания и обучения.</p>	Постоянно	Администрация СОШ № 27, педагогический коллектив, техн. персонал, мед. работник
	<p><b>Разработать и утвердить руководителем ОО комплексный (оперативный) план санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, обеспечивающих предупреждение распространения энтеровирусных инфекций при возникновении заболеваний энтеровирусными (неполио) инфекциями в ОО (в эпидемических очагах) с назначением ответственных за каждый раздел работы:</b></p>		
	<p>1. Проводить активное выявление больных методом опроса, осмотра при утреннем приеме детей, в случае появления лиц, подозрительных на заболевание, проводить их немедленную изоляцию</p>	Постоянно	Педагогический коллектив (оказывать содействие мед. работнику), мед. работник
	<p>2. При выявление больных энтеровирусной инфекцией немедленно представлять в филиал "Центра гигиены и эпидемиологии" экстренное извещение по <a href="#">форме N 058/у</a></p>	Постоянно	Мед. работник
	<p>3. Каждый случай энтеровирусного заболевания (или подозрения на это заболевание) регистрировать и учитывать по месту его выявления в детских учреждениях в журнале учета инфекционных заболеваний (<a href="#">форма N 060/у</a>).</p>	Постоянно	Мед. работник
	<p>4. За лицами, подвергшимися риску заражения, устанавливается медицинское наблюдение сроком на 20 дней с момента изоляции последнего заболевшего (при тяжелых клинических проявлениях ЭВИ) и на 10 дней (при лёгких формах ЭВИ). Медицинское наблюдение контактных осуществлять ежедневно с внесением результатов осмотра в соответствующие медицинские документы (листы наблюдений). Провести инструктаж с лицами, контактными по ЭВИ о правилах соблюдения личной гигиены.</p>	Постоянно	Мед. работник
	<p>5. В отдельных случаях организовать взятие клинического материала от контактных в очаге для лабораторных исследований (Необходимость взятия материала от контактных, а также тип клинического материала и кратность его взятия определяется специалистами территориальных органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор совместно со специалистами органов управления здравоохранением).</p>	По эпид. показаниям	Мед. работник
	<p>6. Ввести ограничение (вплоть до запрещения) проведения массовых</p>	По эпид.	Администрация СОШ № 27,

<p>мероприятий, купания в бассейнах;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прекратить прием новых и временно отсутствующих детей в группу (класс), в которой зарегистрирован случай ЭВИ;</li> <li>- запретить перевод детей из группы (класса), в которой зарегистрирован случай ЭВИ, в другую группу (класс);</li> <li>- запретить участие карантинной группы (класса) в общих культурно-массовых мероприятиях детской организации;</li> <li>- организовать прогулки карантинной группы с соблюдением принципа групповой изоляции на участке и при возвращении в группу;</li> <li>- соблюдать принцип изоляции детей карантинной группы (класса) при организации питания.</li> <li>- закрепить карантинный класс за отдельным помещением</li> </ul>	показаниям	педагогический коллектив, мед. работник
<p>7. Проводить приостановление занятий в классах по необходимости в случае ухудшения ситуации по согласованию с управлением Роспотребнадзора</p>	По эпид. показаниям	Администрация СОШ № 27, педагогический коллектив, мед. работник
<p>8. Провести повторный инструктаж с техническим персоналом по вопросам организации противоэпидемических мероприятий с отметкой в журнале</p>	По эпид. показаниям	мед. работник
<p>9. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий - заключительную и текущую дезинфекцию.</p> <p>Текущую дезинфекцию проводить во всех местах общего пользования и пребывания больного. сотрудниками ООО после проведенного медицинскими работниками инструктажа.</p> <p>Для организации текущей дезинфекции экспозицию препаратов увеличивать в 2 раза.</p> <p>Дезинфекции подлежат столовая посуда, игрушки, предметы обстановки в комнатах приема пищи, игровых, двери и дверные ручки, подоконники.</p> <p>Сразу после изоляции заболевшего провести заключительную дезинфекцию силами организации дезинфекционного профиля, с которой заключён договор.</p> <p>При проведении заключительной дезинфекции (в отсутствии людей) поверхности в помещениях обрабатывают способом орошения раствором дезинфицирующего средства с помощью различных распылителей. Предметы, бывшие в употреблении у больного (посуда, белье, предметы ухода и пр.), обрабатывают способом протирания, либо погружают в дезинфицирующий раствор.</p> <p>Все виды работ при проведении заключительной дезинфекции осуществлять с использованием средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, халат, шапочка, резиновые сапоги).</p>	По эпид. показаниям	Администрация СОШ № 27, техн. персонал, мед. работник
<p>10. Если в очаге имеются насекомые (мухи, тараканы), перед проведением заключительной дезинфекции в помещениях провести дезинсекцию, силами организации, с которой заключён договор.</p>	По эпид. показаниям	Администрация СОШ № 27, техн. персонал, мед. работник

	11. Установить питьевой режим с обязательным кипячением воды или раздачей бутилированной воды.	Постоянно	Администрация СОШ № 27, педагогический коллектив
	12. Усилить контроль за системой водоснабжения, организацией питания, содержанием территории, соблюдению режима детских организованных коллективов.	По эпид. показаниям	Администрация СОШ № 27, педагогический коллектив, техн. персонал, мед. работник
	13. Помещения проветривать как можно чаще, не менее 4-х раз в день. Осуществлять контроль за температурным режимом.	Постоянно	Администрация СОШ № 27, педагогический коллектив, техн. персонал, мед. работник
	14. Использовать бактерицидные облучатели, рециркуляторы с целью ультрафиолетового излучения согласно руководства по эксплуатации	По эпид. показаниям	Администрация СОШ № 27
	15. Организовать обработку рук персонала кожным антисептиком, предназначенным для гигиенической обработки рук.	По эпид. показаниям	Администрация СОШ № 27
	16. Проводить активную разъяснительную работу среди населения;	постоянно	Администрация СОШ № 27, педагогический коллектив, мед. работник
	18. При возникновении групповых заболеваний (15 и более - в образовательных организациях) организовать внеочередное донесение в установленном порядке в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Роспотребнадзора.	По эпид. показаниям	Администрация СОШ № 27, педагогический коллектив, мед. работник

## Приложение №2

### Энтеровирусные инфекции. Серозный менингит.

Энтеровирусы вызывают различные инфекционные заболевания человека, в том числе и серозный менингит. Около 85% случаев энтеровирусных инфекций протекает бессимптомно, 12-14 % - как лёгкие лихорадочные состояния, 1-3% - имеют тяжёлое течение, особенно у детей раннего возраста и лиц с нарушениями иммунной системы.

Серозные менингиты - не самостоятельные заболевания, а проявления различных вирусных инфекционных болезней, среди которых известные: ОРВИ, грипп, корь, краснуха, эпид. паротит и другие. Но чаще всего серозный менингит – одно из проявлений энтеровирусной инфекции.

Энтеровирусная инфекция хорошо поддаётся лечению и протекает относительно легко.

При серозном менингите наблюдается повышение температуры тела, головная боль, светобоязнь, ригидность затылочных мышц, рвота, потеря аппетита, беспокойство, плохой сон, может быть сыпь, боль в горле, в мышцах, жидкий стул, слезотечение, жжение и боль в глазах, увеличение лимфоузлов.

Источником инфекции является больной человек и «здоровый» носитель вируса. Вирус обнаруживают в крови, моче, носоглотке и фекалиях.

Пути передачи вируса – водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушно-капельный.

Факторами передачи служат вода, грязные овощи, грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды.

Заболеемость энтеровирусными инфекциями имеет выраженную весенне – осеннюю сезонность.

Энтеровирусы быстро разрушаются под воздействием ультрафиолетового облучения, при высушивании, кипячении.

Чтобы уберечь себя и своего ребёнка от энтеровирусной инфекции необходимо : увеличить сопротивляемость организма любыми доступными средствами ( витамины с микроэлементами и другие средства, направленные на повышение иммунитета), но главное – это соблюдение правил гигиены. Нужно мыть руки и не пить сырой воды. Воду можно пить только бутилированную или кипячёную.

В детских садах и школах при появлении заболевших вводятся противоэпидемические мероприятия ( в т. ч. и дезинфекционные).

ООМПДП в ОО ГУЗ ЯО «Городская Детская Больница»

## Приложение №3

### Памятка по профилактике энтеровирусной инфекции

Энтеровирусная инфекция - инфекционное заболевание, вызываемое определенным видом вируса.

Заражение происходит через воду, продукты питания, а также испражнения больного, через мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании. Очень часто заражение происходит при купании в открытых водоемах.

Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении, при воздействии хлорсодержащих препаратов, ультрафиолетового облучения.

Вирус поражает все органы и ткани, но в основном поражается нервная ткань, сердце, печень, поджелудочная железа, мышечная ткань, глаза.

Что делать, если Вы заболели?

#### **Уважаемые пациенты!**

**Напоминаем о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления симптомов инфекционного заболевания и соблюдения простых профилактических мер для предупреждения заражения энтеровирусными инфекциями:**

- старайтесь, по возможности избегать контактов с лицами, имеющими признаки инфекционного заболевания; ограничьте контакты детей раннего возраста, сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;

- соблюдайте правила личной гигиены; мойте руки перед едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета; обрабатывайте руки, разрешенными для этих целей дезинфектантами; соблюдайте «респираторный этикет»: при кашле и чихании рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовыми платками и выбрасывать в урну после использования, затем вымыть руки или обработать влажной салфеткой;

- пользуйтесь индивидуальной посудой, следите за чистотой предметов ухода за детьми раннего возраста;

- тщательно промывайте горячей водой, приобретенные на рынках и в торговой сети, овощи и фрукты;

- проводите влажную уборку, чаще проветривайте помещения;

- не купайтесь в непроточных водоемах и фонтанах, в местах несанкционированных пляжей;

- не пейте воду из непроверенных источников, при употреблении напитков в общественных точках и из питьевых фонтанчиков предпочтительнее использовать индивидуальный одноразовый стакан.

Помните, что заболевание легче предупредить, соблюдая элементарные меры профилактики, чем лечить!

Будьте здоровы!

ООМПДП в ОО ГУЗ ЯО «Городская Детская Больница»